Dr.Yglo

WARZENMITTEL

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES DR. YGLO WARZENMITTELS DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH, AUCH WENN SIE DAS PRODUKT SCHON EINMAL VERWENDET HABEN. DIE INFORMATIONEN KÖNNEN SICH AUFGRUND NEUER STUDIEN UND ERKENNTNISSE GEÄNDERT HABEN, SEITDEM SIE DAS PRODUKT LETZTMALS VERWENDET HABEN. BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. FÜR ERWACHSENE UND KINDER (AB 4 JAHREN)

WOZU WIRD DAS DR. YGLO WARZENMITTEL ANGEWANDT?
Das Dr. Yglo Warzenmittel ist ein Medizinprodukt zur Behandlung von gewöhnlichen Warzen. Das Dr. Yglo Warzenmittel enthält Monochloressigsäure, eine Substanz, die eine hornlösende (keratolytische) Wirkung auf die Haut hat. Sie löst die Warze Schicht für Schicht auf. Die Monochloressigsäure zerstört die Zellen, die das Warzenvirus enthalten.
Der Vorteil des Dr. Yglo Warzenmittels besteht darin, dass sie schmerzfrei direkt auf die Warze aufgetragen werden kann, wodurch sie bei einer korrekten Anwendung durch einen Erwachsenen auch für Kinder geeignet ist.

Dr. Yglo Warzenmittel ist nur zur Behandlung gewöhnlicher Warzen vorgesehen:
- Treten vor allem an Händen und Füßen auf
- Gleiche Farbe wie die Haut
- Umfang variiert zwischen weniger als einem Millimeter und mehr als einem Zentimeter
- Meist bilden sich mehrere Warzen gleichzeitig
- Die Kontamination erfolgt häufig durch direkten Kontakt, aber auch durch Handtücher oder kontaminierte Oberflächen
- Kratzen und Nägelkauen erhöhen das Risiko einer Infektion

Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel NICHT bei Alterswarzen
- Können in verschiedenen Größen und Farben auftreten
- Durchschnittlicher Umfang zwischen 0,5 und 1 cm
- Zu Beginn oft als hautfarbene, gelbbraune oder graubraune Flecken zu erkennen. Später werden sie größer und dicker
- Sie sehen aus, als lägen sie auf der Hautoberfläche und ließen sich leicht abkratzen, sind aber tatsächlich fest mit der Haut verbunden
- Sie können überall am Körper auftreten, außer an den Handflächen und Fußsohlen sowie an den Lippen. Am wahrscheinlichsten treten sie auf der Brust, dem Rücken und dem Gesicht sowie dem Hals auf

NICHT bei Dornwarzen (verruca plantaris)
- Entstehen meist auf der Unterseite des Fußes/Fußsohle;
- Üblicherweise flach und umgeben von harter, verdickter Haut;
- Ähneln einem Hühnerauge;
- Können kleine schwarze Punkte enthalten;

Gebrauchsanweisung (Verbrennungen vorbeugen):

VORGEHENSWEISE:
Auftragung durch Erwachsene;
- Nur an Händen und Füßen verwenden! Das Produkt nicht auf anderen Körperteilen anwenden;
- Die umliegende Haut mit Vaseline oder Zinksalbe einreiben, um die Haut zu schützen;
- Die Flasche auf einen festen Untergrund stellen, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist.
- Die Warze/Verruca beim Auftragen nur einmal abtupfen;
- Die Warze nur einmal pro Woche abtupfen;
- Die Flüssigkeit nur mit der Warze/Verruca in Kontakt kommen lassen;
- Den Kontakt mit gesunder Haut vermeiden;
- Die Flüssigkeit nach dem Auftragen gut trocknen lassen;
- Die Warze/Verruca unbedeckt lassen;
- Das Ergebnis ist nach 1 Woche sichtbar;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

VERMEIDEN SIE FOLGENDES:
- Auftragung von Menschen unter 18 Jahren;
- Das Produkt auf Warzen/Verrucas an allen Körperteilen außer an Händen und Füßen auftragen;
- Auf jede Warze auftragen, die sich ganz oder teilweise unter einem Nagel befindet;
- Nicht anwenden bei Warzen, die ganz oder teilweise an der Fußsohle auftreten (Plantarwarzen);
- Die Flüssigkeit mit der gesunden Haut in Kontakt kommen lassen;
- Auftragen, wenn Ihre Hände zittern oder Ihre Finger steif sind;
- Die Warze bei der Anwendung mehr als einmal abtupfen;
- Die Warze/Verruca nach dem Auftragen der Flüssigkeit abdecken;
- Anwendung auf Muttermalen, Wasserwarzen, offenen Wunden, Hyperpigmentierung, Alterswarzen, Dornwarzen, dunklen, behaarten oder anormal aussehenden Warzen.
- Anwendung während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- Wiederholen der Behandlung in einem kürzeren Abstand als einmal die Woche.

WARNUNGEN
Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel nicht:
- Bei Kindern unter 4 Jahren
- Wenn Sie empfindlich auf einen oder mehrere der Inhaltsstoffe reagieren. Verwenden Sie die Flüssigkeit niemals im Gesicht (die Flüssigkeit darf niemals mit den Augen sowie Nasen- und Mundschleimhäuten in Berührung kommen)
- Für Genitalwarzen oder im Genitalbereich
- Auf Muttermalen, molluscum contagiosum, offenen Wunden, Leberflecken, Nävi, braunen Alterswarzen, dunklen, behaarten oder anormal aussehenden Warzen.
- Bei roten, gereizten oder infizierten Warzen
- Unmittelbar nach einer chirurgischen Entfernung von Warzen, dem Einfrieren der Warze (Kryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt insbesondere, wenn die Haut nach der Behandlung gerötet ist oder schmerzt. Warten Sie in diesem Fall mindestens 4 Wochen, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig verschwunden ist. Erst dann können Sie das Dr. Yglo Warzenmittel wieder nutzen
- Während der Schwangerschaft oder der Stillzeit
- Bei Warzen, die ganz oder teilweise unter dem Nagel auftreten
- Die Warze max. einmal abtupfen und den Vorgang nach einer Woche nur wiederholen, wenn nötig.
- Auf Warzen anwenden, die komplett oder teilweise auf der Fußsohle auftreten (Dornwarzen)

Verwenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel mit äußerster Sorgfalt:
- im Falle von Zweifeln an der Diagnose (die Veränderung der Haut kann nicht eindeutig als Warze identifiziert werden)
- bei Immunschwäche (z. B. wenn Sie Zytostatika einnehmen)
- bei Diabetes oder anderen Beschwerden wie Gefäßerkrankungen, aufgrund derer Wunden weniger gut heilen.

In diesen Fällen dürfen Sie das Dr. Yglo Warzenmittel nicht anwenden, bevor Sie einen Arzt konsultiert haben

SONSTIGE HINWEISE
- Nur für die äußerliche Anwendung bestimmt
- Mit äußerster Vorsicht verwenden Die Flüssigkeit das Dr. Yglo Warzenmittels ist ätzend. Nicht einnehmen, nicht einatmen und den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
- Wenn gesunde Haut mit der Flüssigkeit in Berührung kommt, die Haut mit Wasser abspülen. Wenn die Haut trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen gereizt wird, muss die Stelle wie eine Verbrennung behandelt werden.
- Bei Kontakt des Dr. Yglo Warzenmittels mit den Augen, die Augen einige Minuten lang behutsam ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und möglich. Danach weiterspülen.
- Bei Einnahme oder Verschlucken des Dr. Yglo Warzenmittels, den Mund ausspülen. Erbrechen verhindern. Sofort den Vergiftungsnotruf Tel. 145 oder einen Arzt anrufen.
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht nachlassen
- Die Flasche nach dem Gebrauch sorgfältig verschließen und aufrecht lagern
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Die Nutzung durch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kontakt mit Kleidung, Textilien, Tischtüchern oder der Haut vermeiden
- Bei Auftreten von Blasen die Anwendung abbrechen
- Die Warze max. einmal abtupfen und den Vorgang nach einer Woche nur wiederholen, wenn nötig

NEBENWIRKUNGEN
Das Dr. Yglo Warzenmittel kann einige Nebenwirkungen verursachen, die jedoch nicht in jedem Fall auftreten. Zu den Nebenwirkungen einer Anwendung des Dr. Yglo Warzenmittels gehören Hautreizungen, ein brennendes Gefühl, Hautrötungen und Überempfindlichkeit der Haut. Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.

WECHSELWIRKUNG VON MEDIKAMENTEN
Uns sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten bekannt.

PACKUNGSINHALT DES DR. YGLO WARZENMITTELS
Eine Flasche mit 2 ml einer Mischung aus Monochloressigsäure (50 %) und gereinigtem Wasser (50 %). Ein spezieller Applikator zum Auftragen der Formulierung auf die Warze.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Lagern Sie das Dr. Yglo Warzenmittel bei einer Temperatur von 15–25 °C an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Das Verfallsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung aufgedruckt. Nach dem Öffnen nicht länger als 4 Wochen verwenden.

Weitere Informationen zum Dr. Yglo Warzenmittel finden Sie unter www.drYglo.com. Wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt bitte an den Händler.

MEDIZINPRODUKT:
Das Dr. Yglo Warzenmittel ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie 93/42/EWG.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE
Die Warnzeichen und -symbole auf der Verpackung und der Gebrauchsanweisung sind wichtig, um zu garantieren, dass Sie dieses Produkt sicher und korrekt anwenden und um Sie und andere vor Verletzungen zu schützen. Die Symbole werden in der nachstehenden Tabelle erläutert:

Symbol	Erläuterung
	Symbol für den Hersteller
	Symbol, das darauf hinweist, die Gebrauchsanleitung zu konsultieren
	Symbol, das darauf hinweist, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist
	Symbol für das Verfallsdatum
MD	Symbol, das angibt, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt
	Warnung: Ätzende Substanz
0-3	Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden
	Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	Nicht während der Schwangerschaft oder der Stillzeit anwenden
LOT	Symbol für die Chargennummer
25°C 15°C	Das Produkt muss zwischen 15 °C und 25 °C gelagert werden

ANWENDUNG DES DR. YGLO WARZENMITTELS
(AUFTRAGUNG NUR DURCH ERWACHSENE):

Bitte wenden Sie das Produkt mit äußerster Sorgfalt an.
Die Lösung ist stark ätzend. Seien Sie besonders vorsichtig beim Auftragen auf schwer zugänglicher Teile Ihrer Hände und Füße. Dies gilt insbesondere für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gestörter Feinmotorik (zittrige Hände, steife Finger).



1. Das Dr. Yglo Warzenmittel hat einen kindersicheren Verschluss, der wie folgt geöffnet werden kann: Stellen Sie die Flasche auf einen festen Untergrund, der gegen die ätzende Flüssigkeit beständig ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit Kleidung, Textilien und Tischdecken. Öffnen Sie die Flasche, indem Sie den Verschluss herunterdrücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Vor dem Entfernen der Verschlusskappe Vaseline oder Zinksalbe großzügig auf die gesunde Haut um die Warze herum auftragen.
3. Entfernen Sie die Verschlusskappe von der Flasche.
4. Tragen Sie mit dem Spatel eine kleine Menge des Dr. Yglo Warzenmittels auf die Warze auf (lassen Sie die Flüssigkeit nicht heruntertropfen). Tragen Sie die Flüssigkeit nur auf die Warze auf und tupfen Sie sie nur einmal auf die Warze.
5. Lassen Sie die Lösung einen Moment lang trocknen und bedecken Sie die Warze nicht. Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch sorgfältig. Wenden Sie das Dr. Yglo Warzenmittel nicht öfter als einmal pro Woche an.

Die Flüssigkeit benötigt eine Woche, um die oberste Schicht der Warze aufzulösen, sodass Sie nicht sofort nach der Anwendung ein Ergebnis sehen werden. Je nach Größe und Dicke der Warze kann es erforderlich sein, die Behandlung mit dem Dr. Yglo Warzenmittel nach einer Woche zu wiederholen. Wiederholen Sie die Behandlung nicht innerhalb eines kürzeren Abstands als einer Woche.



NUR AUF HÄNDE UND FÜSSE UND NUR AUF GEWÖHNLICHE WARZEN AUFTRAGEN

4+ JAHRE

25°C 15 °C

2ml CE 0481

MD

0-3



CH REP
PK Peters Krizman AG,
Schweizergasse 20,
CH-8001 Zürich

WARNUNG: VERMEIDEN SIE VERBRENNUNGEN: VOR GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN!

Sahag AG
Hubstrasse 104
CH-9500 Wil /
Switzerland

PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17 5406 XP
Uden The Netherlands

Dr.Yglo

REMÈDE ANTI-VERRUES

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LE DR. YGLO REMÈDE ANTI-VERRUES, MÊME SI VOUS AVEZ DÉJÀ UTILISÉ LE PRODUIT AUPARAVANT. LES INFORMATIONS PEUVENT AVOIR ÉTÉ MODIFIÉES EN FONCTION DE NOUVELLES RECHERCHES ET DÉCOUVERTES DEPUIS QUE VOUS AVEZ OUVERT VOTRE DERNIÈRE BOÎTE. CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI AU CAS OÙ VOUS AURIEZ BESOIN DE LE CONSULTER À NOUVEAU. POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS (À PARTIR DE 4 ANS)

DANS QUEL CAS UTILISER DR. YGLO REMÈDE ANTI-VERRUES ?
Dr. Yglo remède anti-verrues est un dispositif médical destiné au traitement des verrues communes. Dr. Yglo remède anti-verrues contient de l'acide monochloracétique, une substance qui a un effet kératolytique sur la peau. La verrue se dissoudra couche par couche. L'acide monochloracétique assure la destruction des cellules contenant le virus de la verrue.
L'avantage du traitement acide des verrues
Dr. Yglo est qu'une application directement sur la verrue n'est pas douloureuse, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé chez les enfants, s'il est correctement appliqué par un adulte.

Le Dr. Yglo remède anti-verrues ne peut être utilisé que sur les verrues communes :
- Elles apparaissent principalement sur les mains et les pieds
- Elles ont la même couleur que la peau
- Leur circonférence varie de moins d'un millimètre à plus d'un centimètre
- Plusieurs verrues apparaissent généralement en même temps
- La contamination se produit souvent par contact direct, mais aussi par l'intermédiaire de serviettes ou de surfaces infectées
- Se gratter et se ronger les ongles augmente le risque de contamination

N'utilisez pas Dr. Yglo remède anti-verrues sur les verrues séborrhéiques
- Elles se présentent sous différentes tailles et couleurs
- Leur circonférence moyenne est de 0,5 à 1 cm
- Elles commencent souvent par une tache de couleur chair, jaune-brun ou gris-brun. Plus tard, elles deviennent plus grandes et plus grasses
- Elles donnent l'impression d'être à la surface de la peau et faciles à enlever en grattant, mais elles sont en fait fermement attachées à la peau
- Elles peuvent apparaître n'importe où sur le corps, à l'exception de la paume des mains et de la plante des pieds, ainsi que sur les lèvres. Elles apparaissent la plupart du temps sur la poitrine, le dos, le visage, et le cou

Verrue plantaire (verruca plantaris)
- Se trouve sous la plante du pied ;
- Généralement plate et entourée d'une peau rugueuse et épaissie ;
- Ressemblent à des callosités ;
- Peut contenir des points noirs ou de minuscules graines ;

Mode d'emploi (prévention des brûlures) :

À FAIRE :
Application par un adulte ;
- Utiliser uniquement sur les mains et les pieds ! Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps ;
- Enduire la peau environnante de vaseline ou d'une pommade à base de zinc pour la protéger ;
- Placer le flacon sur un support solide capable de résister au liquide caustique ;
- Tamponner la verrue une seule fois lors de l'application ;
- Tamponner la verrue seulement une fois par semaine ;
- Veiller à ce que le liquide entre uniquement en contact avec la verrue ;
- Éviter le contact avec la peau ;
- Laisser le liquide sécher complètement après l'application ;
- Ne pas couvrir la verrue ;
- Le résultat est visible après 1 semaine ;
- Tenir hors de portée des enfants.

À NE PAS FAIRE :
- Laisser des personnes de moins de 18 ans appliquer le produit ;
- Appliquer sur une verrue se trouvant sur une partie du corps autre que les mains et les pieds ;
- Appliquer sur toute verrue se trouvant en totalité ou en partie sous un ongle ;
- Ne pas utiliser sur les verrues qui apparaissent entièrement ou partiellement sur la plante des pieds (verrues plantaires) ;
- Laisser le liquide entrer en contact avec une peau saine ;
- L'appliquer lorsque vos mains tremblent ou que vos doigts sont raides ;
- Tamponner la verrue plusieurs fois au moment de l'application ;
- Couvrir la verrue après avoir appliqué le liquide ;
- Appliquer sur les taches de naissance, les verrues d'eau, les plaies ouvertes, l'hyperpigmentation, les verrues séniles, les verrues plantaires, les verrues poilues de couleur foncée ou d'aspect étrange ;
- Appliquer pendant la grossesse ou l'allaitement.
- Répéter le traitement sans attendre un intervalle d'une semaine.

PRÉCAUTIONS
N'utilisez pas Dr. Yglo remède anti-verrues :
- Chez les enfants de moins de 4 ans
- Si vous êtes sensible à un ou plusieurs des ingrédients ou sur le visage (le liquide ne doit jamais entrer en contact avec les yeux ou les muqueuses du nez ou de la bouche)
- Sur les verrues génitales ou situées dans la région génitale
- Sur les taches de naissance, le molluscum contagiosum, les plaies ouvertes, les grains de beauté, les naevus, les verrues séniles (brunes), les verrues plantaires, les verrues de couleur foncée, poilues ou d'aspect étrange.
- Sur les verrues rouges, irritées ou infectées
- Immédiatement après une ablation chirurgicale de verrue(s), une congélation de verrue(s) (cryothérapie) ou un traitement au laser. Cela s'applique particulièrement lorsque la peau est rouge ou douloureuse après le traitement. Dans ce cas, vous devrez attendre au moins 4 semaines, jusqu'à ce que la rougeur ou l'inflammation de la peau ait complètement disparu. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez recommencer à utiliser Dr. Yglo remède anti-verrues
- Pendant la grossesse ou l'allaitement
- N'utilisez pas le produit sur les verrues qui apparaissent entièrement ou partiellement sous un ongle
- Ne pas utiliser sur les verrues qui apparaissent entièrement ou partiellement sur la plante des pieds (verrues plantaires).

Faites particulièrement attention lorsque vous utilisez Dr. Yglo remède anti-verrues :
- En cas de doute sur le diagnostic (le changement de l'aspect de la peau ne peut pas être clairement identifié comme une verrue)
- En cas d'immunodéficience (par exemple en cas d'utilisation de médicaments cytostatiques)
- En cas de diabète ou d'autres affections telles que les maladies vasculaires, à cause desquelles les plaies cicatrisent moins facilement.

Dans ces cas, vous ne pouvez pas utiliser Dr. Yglo remède anti-verrues sans l'accord d'un médecin

AVERTISSEMENTS
- Pour usage externe seulement
- Utilisez avec la plus grande prudence. Le liquide du traitement acide des verrues Dr. Yglo est corrosif. Ne pas ingérer, ne pas respirer et éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Si la peau saine entre en contact avec le produit, veuillez la rincer à l'eau. Si, malgré ces précautions, la peau devient irritée, elle devra subir le même traitement que les brûlures.
- En cas de contact du produit Dr. Yglo contre les verrues avec les yeux, rincer délicatement les yeux pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact si elles sont présentes et si possible.
- En cas d'ingestion ou d'avalage du produit Dr. Yglo, se rincer la bouche. Empêcher le vomissement. Appeler immédiatement le numéro d'urgence en cas d'intoxication (145) ou

un médecin.
- Contactez votre médecin si vos troubles ne s'estompent pas.
- Refermez correctement le flacon après utilisation et rangez-le en position verticale
- Tenez hors de portée des jeunes enfants
- L'utilisation par les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite doit être supervisée par un adulte.
- Évitez le contact avec les vêtements, les textiles, les nappes ou la peau
- Cessez l'utilisation en cas d'apparition de cloques
- Ne tamponnez pas la verrue plus d'une fois et ne répétez que si nécessaire après un intervalle d'une semaine

EFFETS SECONDAIRES
Dr. Yglo remède anti-verrues peut provoquer des effets secondaires, bien que tout le monde n'en souffre pas. Les effets secondaires pouvant découler de l'utilisation du traitement acide des verrues Dr. Yglo sont une irritation de la peau, une sensation de brûlure, une rougeur de la peau ou des réactions d'hypersensibilité. Si l'un de ces effets secondaires devient grave ou si vous remarquez des effets secondaires non mentionnés dans ce mode d'emploi, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
À notre connaissance, il n'y a pas d'interactions avec d'autres médicaments.

CONTENU DU TRAITEMENT ACIDE DES VERRUES DR. YGLO
Un flacon contenant 2 ml d'un mélange d'acide monochloracétique (50 %) et d'eau purifiée (50 %). Un applicateur sur-mesure est utilisé pour appliquer la formulation sur la verrue.

CONDITIONS DE CONSERVATION
Conservez Dr. Yglo remède anti-verrues à une température comprise entre 15 et 25 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine et hors de portée des jeunes enfants.

La date de péremption est indiquée au bas de l'emballage. Après ouverture, n'utilisez pas le traitement plus de 4 semaines.

Pour plus d'informations sur Dr. Yglo remède anti-verrues, visitez le site www.drYglo.com. Pour toute demande de renseignements sur les produits, veuillez contacter le distributeur.

DISPOSITIF MÉDICAL : Dr. Yglo remède anti-verrues est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive 93/42/CEE.

EXPLICATION DES SYMBOLES
Les signes et symboles d'avertissement figurant sur l'emballage et le mode d'emploi sont essentiels pour garantir que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité et pour vous protéger, vous et les autres, contre les blessures. Les symboles sont expliqués dans le tableau ci-dessous :

Symbole	Explication
	Symbole du fabricant
	Symbole indiquant de consulter le mode d'emploi
	Symbole indiquant qu'il faut être prudent lors de l'utilisation du produit
	Symbole de la date d'expiration
MD	Symbole indiquant que l'article est un dispositif médical
	Avertissement : substance corrosive
0-3	Ne convient pas aux enfants de 3 ans ou moins
	Tenir hors de portée des enfants
	Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent
LOT	Symbole du numéro de lot
25°C 15°C	Le produit doit être conservé entre 15 °C et 25 °C

MODE D'EMPLOI DU DR. YGLO REMÈDE ANTI-VERRUES

(APPLICATION PAR DES ADULTES UNIQUEMENT) :

Veuillez appliquer avec le plus grand soin. La solution est caustique. Faites particulièrement attention lorsque vous appliquez le produit sur des parties des mains ou des pieds plus difficiles à atteindre. Ceci s'applique particulièrement aux personnes à mobilité réduite ou en cas de troubles de la motricité fine du système (mains tremblantes, doigts raides).



1. Dr. Yglo remède anti-verrues a un bouchon équipé d'une sécurité pour enfants et peut être ouvert comme suit : Placez le flacon sur un support solide capable de résister au liquide caustique. Évitez le contact avec les vêtements, les textiles ou les nappes. Vous pouvez ouvrir le flacon en appuyant sur le bouchon et en le tournant simultanément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Avant de retirer complètement le bouchon du flacon, appliquez généreusement de la vaseline ou une pommade à base de zinc sur la peau saine entourant la verrue.
3. Retirez le bouchon du flacon.
4. Appliquez ensuite une petite quantité du traitement acide des verrues Dr. Yglo sur la verrue à l'aide de la spatule (ne laissez pas le liquide couler). Veillez à ne l'appliquer que sur la verrue et à ne pas la tamponner plus d'une fois.
5. Laissez sécher quelques instants et ne couvrez pas la verrue. Refermez soigneusement le flacon après utilisation. Dr. Yglo remède anti-verrues ne doit pas être appliqué plus d'une fois par semaine.

Le liquide a besoin d'une semaine pour dissoudre la couche supérieure de la verrue, de sorte que vous ne verrez pas de résultat immédiat après l'application. En fonction de la taille et de l'épaisseur de la verrue, il peut être nécessaire de répéter Dr. Yglo remède anti-verrues après une semaine. Ne répétez pas le traitement à moins d'une semaine d'intervalle.



APPLIQUEZ SUR LES VERRUES COMMUNES SUR LES MAINS ET LES PIEDS UNIQUEMENT

4+ ÂGE MINIMUM D'UTILISATION

25°C 15 °C

2ml e CE 0481

MD



CH REP
PK Peters Krizman AG,
Schweizergasse 20,
CH-8001 Zürich

AVERTISSEMENT : PRÉVENTION DES BRÛLURES : CONSULTEZ LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION !

Sahag AG
Hubstrasse 104
CH-9500 Wil /
Switzerland

PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17 5406 XP
Uden The Netherlands

Dr.Yglo

RIMEDIO PER LE VERRUCHE

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL DR. YGLO RIMEDIO PER LE VERRUCHE, ANCHE SE LO SI È GIÀ UTILIZZATO IN PRECEDENZA. NEL PERIODO TRASCORSO DALL'ULTIMO UTILIZZO, LE INFORMAZIONI POTREBBERO ESSERE STATE MODIFICATE IN BASE A NUOVE RICERCHE E SCOPERTE. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO PER RIFERIMENTO FUTURO. PER ADULTI E BAMBINI (DAI 4 ANNI IN SU)

A COSA SERVE DR. YGLO RIMEDIO PER LE VERRUCHE?
Il Dr. Yglo rimedio per le verruche è un dispositivo medico per il trattamento delle verruche comuni. Il Dr. Yglo rimedio per le verruche contiene acido monocloroacetico, una sostanza che ha un effetto cheratolitico sulla pelle. La verruca si dissolverà, strato dopo strato. L'acido monocloroacetico assicura la distruzione delle cellule contenenti il virus della verruca.
Il vantaggio di utilizzare il Dr. Yglo rimedio per le verruche è che l'applicazione diretta sulla verruca non è dolorosa. Perciò, se applicato correttamente da un adulto, può essere utilizzato anche sui bambini.

Il trattamento per verruche Dr. Yglo può essere utilizzato esclusivamente su verruche comuni con le seguenti caratteristiche:



- Appaiono principalmente su mani e piedi
- Hanno lo stesso colore della pelle
- Hanno una circonferenza variabile, da meno di un millimetro a oltre un centimetro
- Si manifestano contemporaneamente in numero elevato
- La contaminazione avviene spesso attraverso il contatto diretto, ma anche attraverso asciugamani o superfici infette
- Grattarsi e mangiarsi le unghie aumenta il rischio di contaminazione

Non utilizzare Dr. Yglo rimedio per le verruche su verruche senili



- Possono presentarsi in diverse dimensioni e colori
- La circonferenza media è di 0,5 - 1 cm
- Spesso appaiono come una macchia color pelle, giallo-marrone, grigio-marrone. Col tempo, diventano più grandi e più spesse
- Appaiono come se fossero appoggiate sulla superficie della pelle e facili da grattare via, ma in realtà sono saldamente attaccate alla pelle
- Possono presentarsi in qualsiasi parte del corpo, ad eccezione dei palmi delle mani, delle piante dei piedi e sulle labbra. Più probabilmente, si presentano sul petto, sulla schiena, sul viso e sul collo

Non utilizzare Dr. Yglo rimedio per le verruche su Verruca plantare (verruca plantaris)



- Si trova sotto la pianta del piede;
- Generalmente piatta e circondata da una pelle ruvida e ispessita ;
- Assomigliano a calli;
- Può contenere punti neri o piccoli semi;

Istruzioni per l'uso - Evitare le ustioni:

COSA FARE:
Applicazione da parte di adulti;
- Usare solo su mani e piedi! Non usare su altre parti del corpo;
- Per proteggere la pelle, spalmare della vaselina o un unguento allo zinco sulla zona circostante la verruca;
- Posizionare il flacone su una superficie solida, in grado di resistere al fluido caustico;
- Durante il trattamento, tamponare la verruca una sola volta;
- Tamponare la verruca una sola volta alla settimana;
- Lasciare che il liquido entri in contatto solo con la verruca;
- Evitare il contatto con la pelle;
- Lasciare asciugare bene il liquido dopo averlo applicato;
- Lasciare scoperta la verruca;
- Il risultato è visibile dopo 1 settimana;
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COSA NON FARE:
- Applicazione da parte di persone di età inferiore ai 18 anni;
- Applicazione su verruche in qualsiasi parte del corpo, ad eccezione di mani e piedi;
- Non utilizzare su verruche che si trovano completamente o parzialmente sulla pianta del piede (verruche plantari);
- Applicazione su verruche che si trovano interamente o parzialmente sotto l'unghia;
- Lasciare che il liquido entri in contatto con la pelle sana;
- Applicazione con mani tremanti o dita rigide;
- Tamponare sulla verruca più di una volta durante l'applicazione;
- Coprire la verruca dopo aver applicato il liquido;
- Applicare su voglie, verruche acquatiche, ferite aperte, iperpigmentazione, verruche senili, verruche plantari. verruche pelose di colore scuro o dall'aspetto strano;
- Utilizzare durante la gravidanza o l'allattamento.
- Ripetere il trattamento senza attendere una settimana.

⚠ PRECAUZIONI
PRECAUZIONI
Non utilizzare Dr. Yglo rimedio per le verruche:
- Su bambini di età inferiore ai 4 anni
- In caso di sensibilità a uno o più ingredienti o sul viso (il fluido non deve entrare in contatto con gli occhi o con le membrane mucose del naso o della bocca)
- Per le verruche genitali o nella zona genitale
- Su voglie, mollusco contagioso, ferite aperte, nei, naevus, verruche senili (marroni), verruche plantari, verruche di colore scuro, pelose o di aspetto strano
- Su verruche rosse, irritate o infette
- Subito dopo una rimozione chirurgica, un congelamento (crioterapia) o un trattamento laser della verruca. Questo vale soprattutto quando la pelle è arrossata o dolorante dopo il trattamento. In questo caso, si dovrà attendere almeno 4 settimane, fino a quando il rossore o l'infiammazione della pelle saranno completamente scomparsi. Solo allora si potrà riprendere a usare il Dr. Yglo rimedio per le verruche
- Durante la gravidanza o l'allattamento
- Sulle verruche che si manifestano completamente o parzialmente sotto l'unghia
- Non utilizzare su verruche che si trovano completamente o parzialmente sulla pianta del piede (verruche plantari).

Prestare molta attenzione quando si utilizza il Dr. Yglo rimedio per le verruche:
- In caso di dubbio sulla diagnosi (quando l'anomalia della pelle non può essere chiaramente spiegata come verruca)
- In caso di immunodeficienza (ad esempio se si stanno usando farmaci citostatici)
- In caso di diabete o di altri disturbi come le malattie vascolari, a causa delle quali le ferite guariscono meno facilmente.

In questi casi, non si può utilizzare il Dr. Yglo rimedio per le verruche prima di aver consultato un medico

⚠ AVVERTENZE
- Solo per uso esterno
- Utilizzare con la massima attenzione. Il fluido del Dr. Yglo rimedio per le verruche è corrosivo. Non ingerire, non inalare ed evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Se la pelle sana entra in contatto con il fluido, sciacquare con acqua. Se, nonostante queste precauzioni, la pelle si irrita, dovrà essere sottoposta allo stesso trattamento come fosse un'ustione
- Se il rimedio per le verruche Dr Yglo viene a contatto con gli occhi, sciacquare delicatamente gli occhi per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e possibili. Continuare quindi a risciacquare.
- Se il rimedio per le verruche Dr Yglo viene ingerito, sciacquare la bocca. Evitare il vomito. Chiamare immediatamente il centro antiveleni al numero 145 o un medico.
- Contattare il proprio medico se i disturbi non si attenuano
- Chiudere correttamente il flacone dopo l'uso e conservarlo in posizione verticale
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli
- L'utilizzo da parte di bambini, anziani e persone meno abili deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Evitare il contatto con abiti, tessuti, tovaglie o pelle
- Interrompere l'uso se si presentano delle vesciche
- Tamponare la verruca non più di una volta e ripetere il trattamento solo se necessario dopo una settimana

EFFETTI COLLATERALI
Dr. Yglo rimedio per le verruche può causare alcuni effetti collaterali, anche se non tutti li sperimentano. Gli effetti collaterali che potrebbero verificarsi con l'uso del Dr. Yglo rimedio per le verruche sono: pelle irritata, sensazione di bruciore, arrossamento della pelle o reazioni di ipersensibilità. Se uno di questi effetti collaterali si aggrava, o se si notano effetti collaterali non elencati in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi a un medico o al farmacista.

INTERFERENZA CON I FARMACI
Per quanto noto, non esistono interazioni con altri farmaci.

CONTENUTO DEL DR. YGLO RIMEDIO PER LE VERRUCHE
Un flacone da 2 ml di una miscela di acido monocloroacetico (50%) e acqua depurata (50%). Un applicatore personalizzato per l'applicazione della formula sulla verruca.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Conservare Dr. Yglo rimedio per le verruche a una temperatura di 15-25°C, in un luogo asciutto e buio, nella confezione originale e fuori dalla portata dei bambini.

La data di scadenza è indicata sul fondo della confezione. Una volta aperto il flacone, non utilizzare per più di 4 settimane.

Per maggiori informazioni sul Dr. Yglo rimedio per le verruche, visitare il sito www.drYglo.com. Per tutte le richieste di informazioni sul prodotto, contattare il distributore.

DISPOSITIVO MEDICO:
il Dr. Yglo rimedio per le verruche è un dispositivo medico di classe IIa, in base alla Direttiva 93/42/CEE.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
Le avvertenze e i simboli riportati sulla confezione e nelle istruzioni per l'uso sono essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto e per proteggere l'utilizzatore e gli altri da eventuali lesioni. I simboli vengono spiegati nella tabella seguente:

Simbolo	Spiegazione
	Simbolo del produttore
	Simbolo che indica di consultare le istruzioni per l'uso
	Simbolo che indica la necessità di prestare attenzione durante l'utilizzo del dispositivo
	Simbolo della data di scadenza
MD	Simbolo che indica che l'articolo è un dispositivo medico
	Attenzione: sostanza corrosiva
0-3	Non adatto a bambini di età inferiore ai 4 anni
	Tenere fuori dalla portata dei bambini
	Non adatto a donne in gravidanza o durante l'allattamento
LOT	Simbolo del numero di lotto
25°C 15°C	Il prodotto deve essere conservato tra 15 e 25°C

COME USARE DR. YGLO RIMEDIO PER LE VERRUCHE

(APPLICAZIONE SOLO DA PARTE DI ADULTI):

Applicare con la massima attenzione.
La soluzione è caustica. Prestare molta attenzione quando si applica il prodotto sulle parti più difficili da raggiungere di mani o piedi. Questo vale in particolare per le persone con mobilità limitata o in caso di disturbi delle funzioni motorie fini (mani tremanti, dita rigide).



1. Dr. Yglo rimedio per le verruche è dotato di un tappo a prova di bambino che può essere aperto come segue: Posizionare il flacone su una superficie solida, in grado di resistere al fluido caustico. Evitare il contatto con abiti, tessuti o tovaglie. Per aprire il flacone, premere il tappo e ruotarlo contemporaneamente in senso antiorario.
2. Prima di rimuovere completamente il tappo dal flacone, spalmare abbondante vaselina o unguento allo zinco sulla pelle sana che circonda la verruca.
3. Rimuovere il tappo dal flacone.
4. Quindi, applicare una piccola quantità di Dr. Yglo rimedio per le verruche sulla verruca, utilizzando la spatola (evitando che il liquido goccioli). Assicurarsi di applicare Wart Away solo sulla verruca e di non tamponare la verruca per più di una volta.
5. Lasciare asciugare per un momento e non coprire la verruca. Chiudere con cura il flacone dopo l'uso. Il Dr. Yglo rimedio per le verruche non deve essere applicato più di una volta alla settimana.

Il fluido necessita di una settimana per dissolvere lo strato superiore della verruca, quindi non si vedranno risultati immediati dopo l'applicazione. A seconda delle dimensioni e dello spessore della verruca, può essere necessario ripetere il trattamento dopo una settimana. Non ripetere il trattamento prima che sia trascorsa una settimana.



APPLICARE SU VERRUCHE COMUNI, ESCLUSIVAMENTE SU MANI E PIEDI

4+ DAI 4 ANNI IN SU

25°C 15 °C

2ml e CE 0481

MD



CH REP
PK Peters Krizman AG,
Schweizergasse 20,
CH-8001 Zürich

AVVERTENZA - EVITARE LE USTIONI: CONSULTARE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO!

Sahag AG
Hubstrasse 104
CH-9500 Wil /
Switzerland

PK Benelux B.V.
Vluchtoord 17 5406 XP
Uden The Netherlands